

すぐに役立つくらしの健康情報——

# こんいちわ

2025年11月号



社会医療法人同心会  
西条中央病院

—私たちは地域医療に貢献します—

休診日 日曜・祝祭日 第1・3・5土曜 第2・4水土曜午後

当院HP



公式Instagram



**QOLを高める!  
ホームドクター・アドバイス**  
**男性の3大良性疾患**

**メディカル・プロファイリング**  
**脂質異常症**

- 人生100年時代の知恵  
腹八分目に医者いらず
- はつらつ健康ナビ  
骨盤底筋を鍛えよう!
- 見逃さないで、この症状!  
さまざまな病気が  
肩こりを引き起こす
- あなたの知らない感染症の世界  
ブルセラ症

肝腎要（かんじんかなめ）の言葉が示すように私たちの体の中で大きな役割を担っているのが腎臓です。その割に身近で「腎臓の調子が悪くってさあ」という言葉が聞かれるのは、ちょっとそこら腎臓の機能が落ちても体調に現れることがない。沈黙の臓器“だからです。体内では血液をきれいにする仕事を休まずに続け、あまり文句を言わないありがたい存在ですが、困ったことも分かっています。年齢とともに機能が低減しやすくなります。それでも生涯を終えるまでには十分に働いてくれる力がありますが、経年劣化しやすく予備の力が少ない臓器と言えます。しかも、高血压・糖尿病といった生活習慣病が加わると機能低下が加速してしまい、一生の間でその働きが尽きてしまうことになります。気づかれにくい慢性腎炎や相性の悪い薬が原因になることもあります（最近ではサプリメント紅麹がニュースになりました）。十分な働きができなくなってしまうと腎臓の代わりをしてくれる治療（透析療法や腎移植）を行ふことがあります。

普段は気付かれにくい腎臓の状態ですが、近年は早い段階で検出ができるよう計算式を使って腎機能（糸球体濾過量）を数値化するようになりました。

2002年からは慢性腎臓病という新しい病名が付けられ、腎臓の推定値が60を下回った段階で検査や治療を受けることが勧められています。2012年には日本人に合わせた新しい計算式が開発され、より正確な検査法（シスタチンC測定）が使えるようになっています。

モノ言わぬ自分の腎臓が気になつたら、まずは検査を勧められた時には当院へお気軽にご相談ください。

2002年から慢性腎臓病といつた新しい病名が付けられ、腎臓の推定値が60を下回った段階で検査や治療を受けることが勧められています。2012年には日本人に合わせた新しい計算式が開発され、より正確な検査法（シスタチンC測定）が使えるようになっています。

モノ言わぬ自分の腎臓が気になつたら、まずは検査を勧められた時には当院へお気軽にご相談ください。

# 女性の 3大良性疾患

女性の3大良性疾患は子宮に関わる病気で、良性ながらもつらい症状をともなうことが少なくありません。日常生活だけでなく、妊娠にも大きな影響があります。この記事では、それぞれの病気の特徴や症状、治療法についてわかりやすく解説します。

## 女性の3大良性疾患


「子宮筋腫」「子宮内膜症」「子宮筋症」——この3つの病気が、女性の3大良性疾患と呼ばれています。

子宮筋腫は、大きさや数、発生する部位でさまざま現われ方をし、それによって症状の出方の有無や強弱、妊娠への影響などが変わってくる。

子宮内膜症

子宮内膜組織（子宮内膜やそれに似た組織）が、子宮の内側以外の場所（おもに腹膜（子宮の外側を覆う膜）や卵巢）で増殖する。

子宮内膜症が腹膜で起こると、腹膜が厚く硬くなつて周辺の臓器と癒着することで、激しい痛みが生じる。



子宮内膜症が卵巣で起こるとそ

こに経血が溜まつて、「チョコレート嚢胞」と呼ばれる腫瘍になることがある。

## 子宮腺筋症

子宮内膜組織が子宮平滑筋に侵入して増殖することで発症する。子宮腺筋症によって子宮筋層が肥厚化すると、重い月経通や過多月経などを引き起こす。子宮が肥大化することもある。



# QOLを高める！ホームドクター・アドバイス

## 良性疾患とは？ がんとの違い

女性の3大良性疾患に共通することのひとつは、「良性疾患（良性腫瘍）」であるという点です。

良性疾患（良性腫瘍）の特徴は、次のようになっています。

①腫瘍が周囲の組織に浸潤しない（広がらない）。

②ほかの臓器などへの移転はない。

③腫瘍が大きくなるスピードは比較的遅い。

これらとは反対の状態が見られるとときは、悪性腫瘍（がん）が疑われます。

悪性疾患と違い、良性疾患が命に関わるケースはごく稀です。

ただし、良性腫瘍と悪性腫瘍を見極めることは、自己判断では不可能です。

## おもな症状と 日常生活・妊娠への影響

女性の3大良性疾患では、次のような症状が見られます。

○月経困難症（月経痛） 生理中

産婦人科医による診察と、超音波、CT、MRI、血液検査、組織診などの検査が不可欠になります。

女性の3大良性疾患においては、症状の有無や強弱、妊娠を含んだライフスタイルに応じて

## 廿性ホルモンの過剰な分泌

女性の3大良性疾患に共通することのふたつ目は、「女性ホルモン（エストロゲン）」との関連が深いという点です。

エストロゲンには、子宮内膜を増殖させて妊娠の準備を整える働きがあります。

しかしエストロゲンの過剰分泌などで、この働きに乱れが生じると、子宮筋腫が大きくなったり、悪化させる要因となります。



## 治療法は症状や ライフスタイルに応じて

手術療法 子宮を温存して病巣のみを除去する方法や、今後の妊娠を希望しない場合は、根治を目指して子宮全体を摘出する「子宮全摘出術」があります。術式としては開腹手術だけでなく、カメラと手術器具を挿入して、モニターに映る映像を見ながら行なう腹腔鏡手術が現在は主流になっています。

女性の3大良性疾患においては、症状の有無や強弱、妊娠を含めたライフスタイルなどを考慮して、医師と相談しながら最適な治療法を選択することが大切になります。

○過多月経 月経の出血量が異常に多い。経血に含まれる物質によって子宮が強く収縮し、貧血の原因ともなる。

○経過観察 軽度であったり、無症状の場合は、定期的に検査を受けて経過を見る。

便秘、下痢、性交痛といった症状が起こることもあります。

○薬物療法 低用量ピルでエストロゲンの過剰分泌を抑え、月经通を緩和する。ホルモン療法によって子宮内膜の増殖を抑制したり、一時的に閉経と似た状態にして、症状を改善する。

○手術療法 子宮を温存して病巣のみを除去する方法や、今後の妊娠を希望しない場合は、根治を目指して子宮全体を摘出する「子宮全摘出術」があります。術式としては開腹手術だけでなく、カメラと手術器具を挿入して、モニターに映る映像を見ながら行なう腹腔鏡手術が現在は主流になっている。

# 動脈硬化を引き起こす最大の原因

## 脂質異常症

脂質異常症の発症は、「血液中に存在する脂質の量」に異常が起ることから始まります。とくに問題となるのは、LDLコレステロールの増加です。

### 脂質異常症から重篤な病気への流れ

LDLコレステロールは増えすぎると、血管の壁に付着して粥状の塊（アテローム）を作る性質があります。

血管にできたアテロームによって血管内が狭く、厚く、硬くなりますが、これにより、血液の流れが阻害され、脳梗塞や心筋梗塞下を引き起こします（脳梗塞、心筋梗塞）。

またアテロームは、破れて出血することがあり、そのときできた血の塊（血栓）によって血管が塞

がれると、重篤な脳梗塞、心筋梗塞の発症へとつながります。

#### 【まとめ】

- ① LDLコレステロールの増加。
- ② 血管の壁にアテロームを生成。
- ③ アテロームにより血管が狭く、厚く、硬くなる（動脈硬化）
- ④ 動脈硬化によって血液の流れが阻害され、脳梗塞や心筋梗塞といった重篤な病気の発症に。

### 脂質異常症の診断基準

脂質異常症の診断は、次の数値に該当するかで行なわれます。

○ LDLコレステロール 40 mg / dl

／ dl 以上

○ HDLコレステロール 40 mg / dl

／ dl 以上

未満 ○ 中性脂肪 150 mg / dl 以上（空腹時） ○ 中性脂肪 175 mg / dl 以上（非空腹時）

ルのバランス異常を引き起こすため、LDLコレステロールを増加させます。

○ 中性脂肪 175 mg / dl 以上（非空腹時）

### 高血圧・糖尿病・内臓脂肪型肥満との合併

脂質異常症による動脈硬化は、高血圧・糖尿病・内臓脂肪型肥満と合併することで、さらに状態が悪化します（メタボリックシンдром）。

脂質異常症の治療は、多くの場合、まず食事療法と運動療法が行なわれます。

#### 【食事療法】

肉類や乳製品、卵の黄身、イクラ、タラコなどの魚卵からの脂肪摂取を減らす。

青魚による不飽和脂肪酸、野菜・きのこ・豆・海藻類による食物纖維を積極的に摂る。

オリーブオイルやキヤノーラ油などの不飽和脂肪酸を含む油を使

# メディカル・プロファイリング

用する。  
糖類やアルコールの摂取を控え  
る。

## 【運動療法】

ウォーキングやジョギングなど  
の有酸素運動を、毎日30分以上行  
なう。

食事療法と運動療法によつても  
脂質異常症の数値が改善されない、  
あるいは、早急に数値の改善する  
必要がある場合は、LDLコレス  
テロール値を下げる薬による薬物  
療法が検討されます。

## 遺伝的要因が 関係するケース

脂質異常症には、「家族性高コ  
レスチロール血症」に代表される、  
遺伝的要因によつて発症するケー  
スもあります。

ご家族のなかに脂質異常症の方  
がいる、若い頃からLDLコレス  
チロール値が高いという人は、医  
師に相談しましょう。

早くから脂質異常症の治療を受  
けることは、動脈硬化のリスクを  
さげることにつながります。



コレステロールを

感染性胃腸炎の代表的なもの  
は、ノロウイルスによるもので  
す。

ノロウイルスが存在する排  
つ物・吐しや物に触れることや、  
ノロウイルスに汚染された食品  
から感染して、嘔吐や下痢、發  
熱などの症状を引き起こします。  
ノロウイルスの流行はこれま  
で、秋から冬にみられることに  
特徴がありました。

しかし今年は3月を過ぎても  
流行が続き、統計を取り始めて  
以来、夏場に過去最高ペースの  
感染状況が起きました。  
この背景には、「ノロウイルス  
の変異株に対し、多くの人が  
まだ免疫を獲得していないため」

## 生活ほっと ニュース





## ノロウイルスの変異株

と、専門家は指摘しています。  
これから季節、ノロウイル  
ス対策はより大切になります。  
ノロウイルス対策の基本は、  
調理時には手洗いを徹底するこ  
と、しっかりと食材を加熱する  
ことです。

また、感染性胃腸炎の症状を  
起した人がいる場合は、嘔吐  
物や便は、使い捨て手袋・マス  
ク着用をして、塩素系漂白剤で  
処理・消毒してください。  
乳幼児や65歳以上の方の場合  
は、ノロウイルス感染による重  
症化リスクが高くなります。  
嘔吐や下痢による深刻な脱水  
症状や、意識障害、吐いたもの  
に血が混ざっている、耐えられ  
ないほどの激しい痛みがあると  
いった場合は、至急、救急車を  
呼んでください。

この背景には、「ノロウイルス  
の変異株に対し、多くの人が  
まだ免疫を獲得していないため」





# 人生100年時代の知恵

## 腹八分目に医者いらず

腹八分目（満腹になる手前）で食事を終えたときは、心身ともに調子が良い——こうした経験は、皆さまもされているかと思います。

腹八分目を習慣にすることは、健康に良い影響を与えるだけでなく、健康寿命を延ばすことにもつながります。

### 腹八分目が健康長寿の秘訣

「腹八分目に医者いらず」ということわざは、江戸時代の学者・貝原益軒の「養生訓」に書かれていた言葉——「珍美の食に対するも、八九分にてやむべし。十分に飽き満つるは後の禍あり」から生まれ、世の中に広まったとされています。

腹八分目が健康に及ぼす効果は、サルにカロリーを制限した食事を与える実験を、長期にわたって続けた結果によっても裏付けられています。

実験では、がんや糖尿病、脳卒中の発生率が抑えられることや、寿命を延ばすことも確認されました。

この実験結果は、人の健康寿命を延ばすヒントになると考えられています。

### 腹八分目を習慣にするコツ

食生活において、腹八分目を習慣にするコツがいくつかあります。

#### 【一日3度の食事を習慣にする】

3度にわけることで、一回の食事における食べ過ぎを防ぎます。

#### 【時間をかけて食事をする】

人間の場合、食事を始めてから満腹を

感じるまでに20分ほどかかります。食事に20分以上の時間かけることが、食べ過ぎ防止につながります。

#### 【食物繊維を含んだものを食べる】

野菜・きのこ・海藻類などを積極的に摂ることで噛む回数が増え、満腹感を高めてくれます。

#### 【腹八分目の胃腸の感覚を把握する】

普段の食事量をメモしましょう。食べ過ぎていると感じたら量を減らしてみて、腹八分目のときの胃腸の感覚を、ご自身で常に把握するようにしましょう。

#### 【ストレスに注意する】

ストレスがあると、食べる量をある程度一定に保つことが難しくなります。まずはストレス対策を行ない、穏やかな気持ちでゆっくりと食事をするように心掛けてみてください。



このコーナーは文字を大きくしてあります。



## \*骨盤底筋を鍛えよう！\*

咳やくしゃみをした瞬間、「あっ！」と思った経験、ありませんか？ 特に高齢女性の約30%が尿漏れの悩みを抱えているそうです。少しでも快適に過ごすための対策をしましょう。



こんな経験ありませんか？

### なぜ尿漏れ（尿失禁）が起こるのか？

尿漏れは、骨盤の底にある「骨盤底筋」という筋肉が弱つたことにより起こります。水道の蛇口がゆるんで水が漏れるように、骨盤底筋がゆるんで尿が漏れてしまうのです。

その主な原因は、加齢によるものですが、肥満や糖尿病、認知症などが原因となることもあります。

### 主な尿漏れの種類

#### ●腹圧性尿失禁

咳やくしゃみ、お腹に力を入れた時に尿が漏れる。

#### ●切迫性尿失禁

尿意を感じてトイレに行く途中、我慢できずに漏れてしまう。

### 骨盤底筋を鍛える体操

①あお向けに横になり、両足を肩幅程度に開いて、両膝を軽く立てる。

①両足を足を肩幅程度に開いて、背筋を伸ばしてまっすぐ座る。

↓  
②尿道・肛門・膣をキュッとしめたり、ゆるめたりを2～3回繰り返す。

③次は、キュッとしめたまま3秒止め、その後ゆっくりゆるめる。  
これを2～3回繰り返す。



### 注意点

- ・お腹や足腰には力を入れない。
- ・呼吸は止めない。
- \*持病のある方は医師と相談の上行なってください。

## 見逃さないで、この症状！

### さまざま病気が肩こりを引き起こす

肩こりの原因としては、僧帽筋（首の後ろから背中にかけての筋肉）の緊張が続き、僧帽筋の血管が圧迫され、血流が阻害されるためと考えられています。

僧帽筋の血流が阻害されると神経を圧迫して、痛みや重だるさにつながります。

肩こりは、同じ姿勢を続けたり、運動不足、眼精疲労、ストレスといったことによって発症します。

多くの場合、これらの要因を改善し、湿布で

炎症を抑え、マッサージや鍼灸療法を受けることで症状をやわらげることができます。

ただ、それでも肩こりが治まらない場合は、なんらかの重大な病気が隠れていないか疑ってみる必要があります。

長引く肩こりには、頸椎（首の骨の病気）だけでなく、脳や心臓、肺の病気、高血圧や更年期障害など、さまざまな病気が関係していることがあります。

肩こりの辛さを我慢（放置）しないで、かかりつけ医に相談してください。





## れんこんと肉団子の甘酢あんかけ

## 材料 (2人分)

れんこん	250g	酢、砂糖	各大さじ 1/2
豚ひき肉	150g	しょうゆ	大さじ1
片栗粉	小さじ2	塩	小さじ1/4
塩	小さじ1/4	水	1/2カップ
こしょう	少々	片栗粉	小さじ1
米油(又はサラダ油)	大さじ1		
水	大さじ3		

(a)

## 作り方

- れんこんはよく洗って100gをすりおろし、残りは乱切りにする。@を合わせてあんを作つておく。
- ボウルにすりおろしたれんこん、豚ひき肉、片栗粉、塩、こしょうを入れ練りませる。10等分に分けて丸める。
- フライパンに米油大さじ1を中火で熱し、②を入れ全体に焼き色がつくまで焼く。空いてる所に乱切りのれんこんを入れ炒める。水大さじ3を加え蓋をして弱火で5~6分蒸し焼きにする。
- 蓋を外し中火にし、@をもう一度混ぜて加え、全体に混ぜながらあんをからめる。



1人分 344 kcal

## ワンポイント

肉団子にれんこんのすりおろしを入れてもっちりした食感に。乱切りしたれんこんの歯応えを楽しめます。お弁当のおかずにもおすすめです。



クッキングアドバイザー 天野由美子

※ 食事指導を受けている場合は医師に相談しましょう。

# あなたの知らない感染症の世界 ブルセラ症

ブルセラ症とは、ブルセラ菌という細菌による感染症で、主な流行地域は、地中海地域、アジア、アフリカ、中東等ですが、世界中で発生がみられ、日本でも年間数件の報告があります。

感染経路は、汚染された乳製品や加熱が不十分な肉類を摂取したり、感染している動物(ウシ、ヒツジ、ヤギ、ブタ、ラクダ、イヌ)に触れたり、その周辺のホコリなどを吸い込むことでも感染します。ヒトからヒトへの感染はほとんどありません。

潜伏期間は1~3週間で、その後発熱、筋肉痛、倦怠感、発立

汗、頭痛などが起り、重症化する場合があります。

予防接種はなく、抗菌薬による治療が行なわれます。

予防法は、流行地域での乳製品や肉類の摂取には十分注意し、牧場や農場などの動物のいる所に不注意に近づかないことです。



流行地では要注意！

# 頭のストレッチ

二字熟語の「しりとり」です。①~⑩のマスに漢字を入れて完成させて下さい。

スタート	紅	葉	①	店	②
	題		前	心	半
⑥		⑦		⑧	③
	童	雇	解		蓄
⑤			④	立	積



※答えは7ページにあります